

벤토린에보할러(Salbutamol pMDI)가
빈 상태로 잘못 사용될 가능성에 대해 환자와 간병인을 상담하기 위한
보건 의료 전문가용 위해성 상담 안내자료

이 자료는 보건의료전문가가 환자와 간병인을 상담할 때
벤토린에보할러의 올바른 사용방법을 효과적으로 안내하기 위해 제작되었습니다.

아래의 주요 지침을 철저히 전달해 주십시오

일반사항

 **흡입기 투여 용량**

환자와 간병인에게 흡입기가 200회 분무(흡입)만큼의 살부타몰을 포함하고 있다는 사실을 상기시켜 주십시오.

 **흡입기가 처방된 용량 없이 분무될 가능성**

환자와 간병인에게 200번의 분무(흡입) 후에는 흡입기가 계속 분무될 수는 있지만, 처방된 살부타몰 용량이 포함되지 않을 수 있다는 점을 다시 상기시켜 주십시오.

**어떤 것이
바람직한가요?**

 **기록 유지**

환자와 간병인에게 빈 흡입기를 잘못 사용하는 것을 방지하기 위해 흡입기 사용 횟수(분무 횟수)를 기록하는 것을 고려하도록 안내하여 주십시오.

 **예비 흡입기의 잠재적 이점**

환자 및 간병인과 개별적으로 논의하여 환자의 특정 의료적 요구에 따라 예비 흡입기를 보관하는 옵션을 고려해 볼 것을 설명하여 주십시오.
환자가 두 개 이상의 흡입기를 가지고 있는 경우,
각 흡입기의 분무 횟수(흡입 횟수)를 별도로 기록하는 것이 권장됩니다.

**바람직하지
않은 것은
무엇인가요?**

 **흡입기를 흔들거나 무게를 측정하거나 물에 담그는 경우**

환자와 간병인에게 흡입기를 흔들거나, 무게를 측정하거나, 물에 담그는 등의 방법은 흡입기에 처방된 살부타몰 용량이 남아있는지 여부를 정확히 판단하는 데 적합하지 않다는 점을 설명하여 주십시오.

추가 정보

 **웹사이트에 접속하는 방법**

식품의약품안전처 의약품통합정보시스템
(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해
상세제품정보를 참조하시기 바랍니다.

 **이상반응을 보고하는 방법**

GSK 제품 사용 중 발생한 이상사례(부작용)는
080-901-4100 또는 koreasafetyreporting.co.kr으로
보고해 주시기 바랍니다.

pMDI, pressurized metered-dose inhaler.

벤토린에보할러(살부타몰황산염)의 허가시기 (변경일자: 2025.8.4)

벤토린에보할러

살부타몰황산염

[Product Information]



[주]글락소스미스클리인 서울특별시 은평구 한강대로 92 Tel. 080-901-4100

GSK 제품 사용 중 발생한 이상사례(부작용)는 080-901-4100 또는 koreasafetyreporting.co.kr으로 보고해 주시기 바랍니다.

Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies. ©[2025] GSK group of companies or its licensor.

NP-KR-SLB-BROC-250002 Dec 2025

QR코드 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템
(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 상세제품 정보를 참조하시기 바랍니다.

