


모두의 예방접종이 질병을 이길 병으로 2025-2026절기 코로나19 예방접종

대상

65세 이상

1960. 12. 31. 이전 출생자



면역저하자

생후 6개월 이상



감염취약시설 입원·입소자

생후 6개월 이상



일정

65세 이상

75세 이상 | 10. 15.(수) ~

70~74세 | 10. 20.(월) ~

65~69세 | 10. 22.(수) ~

면역저하자

| 10. 15.(수) ~

감염취약시설 입원·입소자

| 10. 15.(수) ~

→ 2026년 4월 30일까지 시행

백신

모더나(LP.8.1), 화이자(LP.8.1) 백신 1회 접종

단, 아직 기초접종을 미완료한 12세 미만 고위험군의 경우 기초접종 완료 필요

기관

전국 위탁의료기관 및 보건소

단, 접종 가능 여부는 반드시 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 사전 확인 필요

이런 분들은 예방접종을 해서는 안 됩니다!

- ☑ 과거 코로나19 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☑ 코로나19 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우



이런 분들은 예방접종을 연기해야 합니다!

- ☑ 발열 등 급성병증이 있는 경우 증상이 없어질 때까지 백신 접종 연기
- ☑ 코로나19 백신(mRNA) 접종 후 심근염·심낭염 발생이 확인된 경우, 안전성에 대한 근거가 마련될 때까지 코로나19 백신 접종 연기

예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- ☑ 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ☑ 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

- ☑ 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 1~2일 이내 호전됩니다
- ☑ 다만 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타난 경우 의사의 진료를 받도록 합니다

