



100\*250 → 200\*200

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.  
첨부문서 작성일자 : 2020년 6월 26일

전문의약품 | 근주용 | 품목기준코드:201802021

# 비알플루텍[테트라백신]<sub>주</sub>

## 프리필드시린지 [인플루엔자 분할백신]

### [제법의 개요]

비알플루텍테트라백신주는 발육계란의 노약강 내에 접종하여 배양시킨 각주 인플루엔자 바이러스를 항원성이 유지되도록 분쇄 및 불활화하여 만든 무색 또는 약간 백탁의 액이 담긴 무색투명한 프리필드시린지 주사제입니다.

### [원료약품의 분량]

유효성분 : 정제불활화 인플루엔자바이러스항원 A형	(별규)	15μg
[A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 CNIC-1909(H1N1)]		
정제불활화 인플루엔자바이러스항원 A형	(별규)	15μg
[A/Hong Kong/2671/2019 IVR-208(H3N2)]		
정제불활화 인플루엔자바이러스항원 B형	(별규)	15μg
[B/Phuket/3073/2013]		
정제불활화 인플루엔자바이러스항원 B형	(별규)	15μg
[B/Washington/02/2019]		
완 충 제 : 염화나트륨	(EP)	4mg
염화칼륨	(EP)	0.1mg
인산수소나트륨이수화물	(EP)	0.6mg
인산이수소칼륨	(EP)	0.1mg
용 제 : 주사용수	(KP)	적량
첨 부 물 : 주사침(별규된 1회용 주사침)	(별규)	1개 (25G X 5/8 (0.5 X 16mm))

[성 성] 무색 또는 약간 백탁의 액이 담긴 무색투명한 프리필드시린지

### [효능·효과]

생후 6개월 이상의 소아 및 성인에서 이 백신에 함유된 인플루엔자 A형 바이러스들 및 인플루엔자 B형 바이러스들에 의해 유발되는 인플루엔자 질환의 예방

### [용법·용량]

생후 6개월 이상의 소아 및 성인에게 1회 용량 0.5mL를 접종하고, 같은 용량으로 매년 1회 접종합니다. 이 백신은 생후 6개월 이상~만 3세 미만 소아의 경우 대퇴부 전외측 (또는 근육량이 충분한 경우 상완 삼각근), 만 3세 이상의 소아 및 성인의 경우 상완 삼각근에 근육 주사 합니다. 단, 인플루엔자 백신을 접종하지 않은 만 9세 미만 소아의 경우 백신 접종 첫째 4주 이상의 간격을 두고 2회 접종합니다. 생후 6개월 미만의 소아에서 이 백신의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았습니다.

### [사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

접종 전에 피접종자에 대하여 문진 및 시진을 하고 필요하다고 인정되는 경우에는 청· 타진 등의 방법에 의해 건강상태를 조사하여 피접종자가 다음의 경우에는 접종하지 않습니다. 다만, 피접종자가 인플루엔자에 감염될 수 있고, 또한 접종에 의해 현저한 장애를 초래할 우려가 없다고 인정될 경우에는 접종할 수 있습니다.

- 발열이 있는 자 또는 현저한 영양장애자
- 심혈관계 질환, 신질환 또는 간질환 환자로 해당 질환이 급성기, 증악기 또는 활동기에 있는 자
- 급성 호흡기 질환 또는 그 외 활동성 감염 질환 환자
- 잠복기 및 회복기 환자
- 이 백신의 성분에 의해 아나필락시스를 일으킨 일이 있는 자
- 계란, 닭고기, 그 외의 닭 유래성분, 백신을 구성하고 있는 성분 등에 대하여 과민한 자
- 이전의 접종에서 2일 이내에 발열을 나타냈던 일이 있는 자 또는 전신성 발진 등의 알레르기가 의심되는 증상을 나타냈던 일이 있는 자
- 접종 전 1년 이내에 경련 등의 증상을 보인자
- 이전에 인플루엔자백신 접종으로 6주 이내에 길랑-바레 증후군이나 다른 신경이상을 나타낸 자

- 과거에 면역부전의 진단을 받은 일이 있는 자
- 기타 이 백신의 접종 실시가 부적당한 상태에 있는 자

### 2. 약물이상반응

- 국소적 발적, 종창, 통증 또는 전신적으로 발열, 오한, 두통, 권태감, 구역 등이 나타날 수 있으나, 보통 2~3일 내에 소실됩니다.
- 드물게 급성 신재생 뇌척수염(ADEM)이 나타납니다. 보통 접종 후 수일로부터 2주간 이내에 발열, 두통, 경련, 운동장애, 의식장애 등이 나타납니다. 이런 증상이 의심되면 MRI 등으로 진단하여 적절한 처치를 합니다.
- 매우 드물게 알레르기 반응에서부터 아나필락시스성 쇼크까지 나타날 수 있습니다.
- 전신 및 국소 신경조직망의 일시적인 장애가 나타날 수 있고 자극 또는 통증에 대한 예민성에 이상이 나타날 수 있으며 마비 증세, 신경통증, 출혈 및 내출혈을 초래하는 혈관, 뇌 또는 신경 염증(예 : 길랑-바레 증후군) 등이 보고된 바 있습니다.
- 건강한 생후 6개월 이상 소아, 성인 및 고령자를 대상으로 한 4개의 임상시험에서 백신의 안전성을 평가하였습니다. 생후 6개월 이상~만 3세 미만 소아 170명의 백신 접종 후, 115명(67.6%)에서 이상사례가 발생하였고 이 중 약물이상반응은 82명(48.2%)이었으며 중대한 약물이상반응은 없었습니다. 만 3세 이상 만 19세 미만의 소아 319명의 백신 접종 후, 218명(68.3%)에서 이상사례가 발생하였고, 이 중 약물이상반응은 204명(63.9%)이었으며, 중대한 약물이상반응은 없었습니다. 만 19세 이상 만 65세 미만의 성인 583명의 백신 접종 후, 415명(71.2%)에서 이상사례가 발생 하였고, 이 중 약물이상반응은 399명(68.4%)이었으며 중대한 약물이상반응은 없었습니다. 만 65세 이상의 고령자 338명의 백신 접종 후 148명(43.8%)에서 이상사례가 발생하였고, 이 중 약물이상반응은 140명(41.4%)이었으며, 중대한 약물이상반응은 없었습니다. (1) 이 백신 접종 후, 7일 동안 관찰된 예측된 약물이상반응은 다음과 같습니다.

		생후 6개월 이상 만 3세 미만 소아 (n=170)	만 3세 이상 만 19세 미만 소아 · 청소년 (n=319)	만 19세 이상 만 65세 미만 성인 (n=583)	만 65세 이상 고령자 (n=338)
국소반응	통증	27.6 %	52.7 %	48.9 %	21.0 %
	압통		54.5 %	56.8 %	27.5 %
	홍반/발적	11.8 %	6.6 %	7.9 %	3.8 %
	경결/부종	5.9 %	8.2 %	5.8 %	3.6 %
전신반응	졸음/〈늘어짐〉 <sup>1)</sup>	15.9 %	—	—	—
	발열	6.5 %	3.1 %	0.9 %	0.3 %
	발한	2.4 %	2.2 %	4.3 %	2.7 %
	오한	2.4 %	5.0 %	7.7 %	4.4 %
	오심/구토	2.4 %	0.6 %	2.2 %	0.9 %
	설사	5.9 %	0.3 %	1.5 %	1.2 %
	피로	—	15.4 %	25.6 %	10.7 %
	권태감	—	11.0 %	7.5 %	8.3 %
	두통	0.6 %	6.9 %	13.4 %	7.1 %
	근육통	7.6 %	8.2 %	26.4 %	6.5 %
	관절통	—	1.6 %	5.8 %	3.6 %

1) 졸음/〈늘어짐〉은 생후 6개월 이상~만 3세 미만의 소아에만 해당되는 항목입니다.

- 이 백신 접종 후 28일 또는 21일 동안 관찰된 예측되지 않은 약물이상반응은 생후 6개월 이상~만 3세 미만 소아에서 4명(2.4%) 발생(감염 관련 3명, 피부 및 피하조직 관련 1명) 하였고, 만 3세 이상~만 19세 미만 소아에서 3명(0.9%) 발생(전신 및 투여부위 상태 관련 2명, 감염 관련 1명) 하였고, 성인에서 13명(2.2%) 발생(감염 관련 5명, 전신 및 투여부위 상태 관련 2명, 실험실 검사 관련 2명, 신경계 관련 1명, 호흡기계 관련 2명, 근육격계 관련 1명, 피부 및 피하조직 관련 1명)하였습니다. 고령자에서 4명(1.2%) 발생(감염 관련 1명, 전신 및 투여부위 상태 관련 1명, 실험실 검사 관련 1명, 신경계 질환 관련 1명)하였습니다.
- 이 백신 접종 후 6개월 동안 관찰된 중대한 이상사례는 생후 6개월 이상~만 3세 미만 소아에서 13명(7.6%) 발생(폐렴 4건, 인플루엔자 3건, 기관지염 2건, 호흡기세포융합바이러스 폐렴 1건, 세기관지염 1건, 급성폐쇄성후두염 1건, 노로바이러스 위장염 1건, 로타바이러스 위장염 1건, 오로감염 1건, 위장관감염 1건, 치유부전 1건, 위장관 내 이물 1건, 열성경련 1건) 하였고, 만 3세 이상~만 19세 미만 소아에서 5명(1.6%) 발생(인후염 1건, 두통 1건, 장간막림프절염 1건, 급성위장염 1건, 편도의 농양 1건, 급성충수염 1건) 하였고, 성인에서 5명(0.9%) 발생(방광염 1건, 결핵 1건, 유방종괴 1건, 장폐색 1건, 위암 1건)하였습니다. 고령자에서는 4명(1.2%) 발생(통증 1건, 관절통 1건, 대상포진 1건, 위암 1건) 하였으나 모두 이 백신과 관련이 없는 것으로 판정되었습니다.

### 3. 일반적 주의

- 피접종자 또는 그 보호자에게 접종 당일 및 다음날은 안정하게 하고 접종부위를 청결하게 유지하며 접종 후 고열, 경련 등의 증상이 나타날 경우에는 신속히 의사의 진찰을 받도록 주지킵니다.
- 내인성 또는 외인성 면역저하 환자에게서 항체 반응이 충분히 나타나지 않을 수 있습니다.
- 인플루엔자 백신은 인플루엔자가 유행하기 전에 접종하여야 합니다 (9~11월). 역학적인 상황에 따라 더 늦게 접종될 수도 있습니다.
- 인플루엔자 백신은 당해에 추천된 군주로 제조된 새로운 백신으로 매년 접종해야 합니다.

### 4. 상호작용

- 이 백신은 다른 백신과의 동시접종에 대한 연구는 실시되지 않았습니다.
- 동시에 면역억제요법을 받고 있는 환자의 경우에는 면역반응이 감소될 수 있습니다.
- 일반적으로 인플루엔자 백신 접종 후, ELISA법을 이용하여 HIV1, HCV, 그리고 특히 HTLV1에 대한 항체를 측정하는 혈청 검사 시 위양성 반응 결과(Western Blot technique으로 위양성임을 확인)가 보고된 적이 있습니다. 이러한 일시적인 위양성 결과는 백신 접종에 의한 IgM 반응에 기인한 것으로 판단됩니다.

### 5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임부 : 불활화 인플루엔자 백신(유정란 유래)은 임신 단계와 관계없이 모든 임신 주기에서 사용할 수 있음이 알려져 있습니다. 임신 1기와 비교하여 임신 2기와 3기에 대해 더 많은 안전성 자료들이 존재합니다. 또한 전 세계적으로 수집된 불활화 인플루엔자 백신의 사용과 관련된 자료를 따르면, 백신으로 인한 태아 및 모체의 유해한 결과는 제시되지 않고 있습니다. 또한 이 백신을 사용하여 실시된 동물 시험에서 생식·발생독성과 관련한 직·간접적인 유해한 영향은 관찰되지 않았습니다. 그러나 이 백신은 임상시험으로 임부 투여 시의 안전성은 평가되지 않았습니다.
- 수유부 : 불활화 인플루엔자 백신(유정란 유래)은 수유부에게 사용할 수 있도록 알려져 있습니다. 제한적 자료에 따르면, 백신이 모유로의 이행 여부는 알려져 있지 않습니다. 그러나 이 백신에 대한 동물을 대상으로 한 수유 중 투여에 대한 적절한 연구 결과는 없으며, 임상시험으로 수유부 투여 시의 안전성은 평가되지 않았습니다.

### 6. 적응상의 주의사항

- 접종 전, 백신을 육안으로 확인하여 어떠한 이물질이나 물리적 성상에 변화가 있는지 검사합니다. 이상이 있는 경우에는 사용하지 않습니다.
- 접종부위는 보통 상완외측으로 하고 에탄올 또는 요오드팅크로 소독합니다. 또한 동일 접종부위에 반복해서 접종하는 것은 가능한 한 피합니다.
- 이 백신은 절대로 정맥주사 하지 않습니다.
- 주사침 끝이 혈관 내로 들어가지 않았는지 확인합니다.
- 다른 백신과 동일한 주사기에서 혼합하여서는 안됩니다.
- 프리필드시린지는 1회용이므로 재사용해서는 안됩니다.

### 7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 이 백신은 동결을 피하여 냉장보관(2~8℃)합니다.
- 사용하기 직전, 충분히 흔들어, 균질하게 혼합되도록 한 후 사용합니다.

[저장방법 및 유효기간] 밀봉용기, 차광하여 2~8℃에서 동결을 피하여 보관 • 제조일로부터 12개월

[포장단위] 0.5mL/프리필드시린지 × 1, 10

### [주사기 사용시 주의사항]

- 주사침 보호용 캡 (needle shield) 이 씌워진 상태에서 밀대를 뒤로 잡아 당기면 고무마개의 변형이 생겨 제품이 미생물등 오염원에 노출될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 주사침 보호용 캡을 제거한 상태에서 밀대를 뒤로 잡아 당기면 주사침을 통해 제품이 미생물등 오염원에 침투할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 본 제품에 사용된 주사기는 1 회용 주사기이며, 백신 투여 후 재사용 할 수 없습니다.

※ 사용전 충분히 흔드십시오.

※ 만약 구입 당시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

※ 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일 기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화:080-708-8088

첨부문서 작성일자 : 2020년 6월 26일

## 보령제약

제조·의뢰 및 판매자 : 보령제약(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109

제조사 : (주)보령바이오파마 충청북도 진천군 광혜원면 사동길 2

제조사 : (주)녹십자 전라남도 화순군 화순읍 산단길 40(최종원액 제조)