

주간 국내외 감염병 동향

('17.8.18-8.24)


국내 주요 감염병 발생 현황

〈레지오넬라증 여름철 증가 양상〉

● 제33주(8.13~19) 8건 발생, 금년 총 112건

* 30주(7.23~7.29) 3건 → 31주(7.30~8.5) 3건 → 32주(8.6~8.12) 11건

* '16년 이후 월 평균 10명 수준으로 발생되다가 여름철에 접어들면서 7월 이후 발생이 증가. 산발적으로 신고되고 있으나 집단발생 가능성이 있어 주의가 필요




〈최근 5년간(2013-2017) 월별 레지오넬라 발생 현황〉

〈장관감염증 세균성 병원체 발생증가〉

● 제33주(8.13~8.19) 246명 발생, 금년 총 3,243명 발생

* 30주(7.23~7.29) 209명 → 31주(7.30~8.5) 219명 → 32주(8.6~8.12) 252명

* 지난주(252명) 대비 총 발생환자(246명)는 감소하였으나, 살모넬라에 의한 장관감염증 환자는 급증



〈최근 3년간(2015~2017) 전국 표본기관의 세균성 장관감염증 발생 현황〉

국내·외 메르스 발생 현황

산발적 발생 보고 지속

국외 발생현황

전체 '17년 총 195명 발생, 55명 사망

* 사우디아라비아 187명(사망 54), 카타르 3명, 아랍에미리트 5명(사망 1)

주간 8.18-8.24일 동안 5명* 발생

* 사우디아라비아 4명, UAE 1명

〈국가별 메르스 환자 발생현황('17년)〉

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	'16년 총계	마지막 발생
총계	195	24	19	19	20	20	59	6	28	252	-
사우디	187	24	19	18	17	17	59	6	27	243	'17.8월
카타르	3	-	-	1	1	1	-	-	-	2	'17.5월
UAE	5	-	-	-	2	2	-	-	1	3	'17.8월
오만	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	'16.11월
쿠웨이트	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	'16.8월

* 발생보고 지역이 아닌 감염지역 기준으로 집계

* 사우디아라비아 리야드시 감염 후 레바논에서 확진 받은 자 1명 포함

사우디 발생현황

전체 '17년 총 187명 발생, 54명 사망


주간 8.18-8.24일 동안 4명(1차감염 2, 조사증 2) 발생

〈'17년 사우디 감염경로별 환자 발생 현황〉

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
계	187	24	19	18	17	17	59	6	27
1차감염	96	20	19	8	12	11	10	5	11
2차감염	84	4	0	10	5	6	46	0	13
조사증	7	0	0	0	0	0	3	1	3



〈사우디 주별 환자 발생 현황 ('14.1.1-'17.8.24)〉



〈사우디 감염경로별 환자 발생 현황 ('15.1.1-'17.8.24)〉

국내 의심환자 신고 현황

전체 '17.1.1-8.22일 의심환자 총 124명(모두 MERS 음성)

주간 '17.8.16-8.22일 동안 의심환자 1명

〈신규 의심환자 현황('17.8.16-8.22)〉

성별/연령	국적	여행국가	검사결과	
			메르스	호흡기바이러스 8종
남/36	대한민국	사우디	음성	Influenza A(H1N1)

국외 홍역 발생 현황

유럽 홍역 사례 지속발생

국외 발생현황

- '17년 루마니아와 이탈리아에서 홍역의 대규모 발생. 국가 차원에서 백신접종이 강화되고 있음에도 불구하고 계속해서 사례 발생


• 홍역환자 발생 현황

루마니아('17년 6,524건), 이탈리아('17.8월까지 4,087명 -사망 3건, 의료인 277명, 89% 미접종), 프랑스('17.7~8월 387건), 오스트리아('17.8월 81건)

• 홍역환자 사망 현황

'16년과 '17년 유럽국가에서 홍역으로 40명 사망 : '16년 루마니아(12명), 영국(1명), '17년 루마니아(20명), 이탈리아(3명), 불가리아, 독일, 포르투갈, 프랑스에서 각 1명 사망

루마니아 '16.1월~17.8.11까지 8,493건 발생(사망 32건 포함)



〈루마니아 홍역 환자 발생현황〉

상황평가

- 유럽국가와 유럽연합 인접국가에서 지속적인 홍역 환자 발생
- 감수성이 있는 인구집단의 확산 차단을 위한 가장 효과적인 방법은 홍역 2회 예방접종 완료


국외 콜레라 발생 현황

나이지리아 라싸열 환자발생 지속


국외 발생현황

나이지리아 '16.12월~'17.8.11일까지 총 241건 보고 (확진 227건, 의심 14건, 사망 82건)

- 라고스 대학병원에서 라싸열 환자 진료한 의료인 3명 2차 감염발생, 접촉자 135명 모니터링 중



〈나이지리아 라싸열 환자 발생현황('16.12~'17.8)〉



〈나이지리아 확진사례 분포현황〉

상황평가

- 의료시설 내 감염예방 및 통제조치 강조와 접촉자 지속적인 모니터링 필요