

2023. 4. 10.

KMA  
대한의사협회

질병관리청

# 코로나19 치료제 처방 권고

의료인용 Q&A



# Q 코로나 19 환자를 살리는 가장 효과적인 치료 방법은?

## A 경증 및 중등증 코로나19환자에게 증상 발생 5일 이내 경구용 치료제 투여

팍스로비드	라게브리오
	








\* 아래에 해당하는 코로나19 환자 중 증상 발생 5일 이내,  
산소치료가 필요하지 않은 환자는 치료제를 처방할 수 있습니다.



### 투여 대상은?

\* 라게브리오는 18세 이상 처방 가능

- ① 60세 이상의 고령
- ② 12세~59세 면역저하자
- ③ 12세~59세 기저질환자

	 <p>당뇨</p>	 <p>심혈관질환</p>	 <p>만성 신장질환</p>	 <p>만성폐질환</p>	 <p>체질량지수 (BMI) 30kg/m<sup>2</sup> 이상</p>	 <p>신경 발달장애</p>
---	---	--	--	--	--	--

\* 당뇨, 심혈관질환, 만성 신장질환, 만성 폐질환, 체질량지수(BMI) 30kg/m<sup>2</sup> 이상, 신경 발달장애 또는 정신질환자



## 코로나19 치료제 처방 시 주의사항이 있나요?

- A** 팩스로비드는 신장애,간장애 환자에게 투여 제한 또는 금기이지만, 라게브리오는 가능합니다.
- A** 약물 상호작용을 고려하여 기저질환으로 복용하는 약물을 5일간 중단하고 투여 가능합니다.






# 팍스로비드 상호작용 약물을 복용 중인 기저질환자는 코로나19 치료제를 복용할 수 있나요?

**A** 기저질환자는 코로나19로 인한 사망의 위험이 높아  
투여대상에 해당하는 경우, 환자의 상태를 확인하여  
치료제의 처방을 우선 고려하시기 바랍니다.

코로나19 환자의 동반질환에 따른 사망위험



Ref. Unusually High Risks of COVID-19 Mortality with Age-Related Comorbidities:

An Adjusted Meta-Analysis Method to Improve the the Risk Assessment of Mortality Using the Comorbid Mortality Data

단 항경련제, 항암제, 리팜핀, 항부정맥제, 항정신병약, 세인트존스워트 등을 복용중인 환자는  
상호작용 약물을 고려하여 기저질환 약물투여 중단에 의한 불편과 불이익을 코로나19 치료의  
이익과 비교하여 투여를 결정해야 합니다.

# 팩스로비드 상호작용 약물, 어떻게 확인할 수 있나요?




의약품 안전사용  
서비스(DUR) 시스템



'치료제 2종' 투여 전  
건강상태 자가점검



대한항균학회의  
팩스로비드 사용지침



Liverpool COVID-19  
Drug Interactions



'나의건강기록' 앱  
본인의 최근 1년간의 의약품 투약 내역 조회 가능



**코로나19 치료제 복용 후,  
부작용 발생 시 계속 복용해도 되나요?**

- A** 치료제의 부작용은 미각이상, 오심, 설사, 혈압상승 및 근육통으로 대부분 경미하며, 코로나19 증상과 유사하므로, 의료인은 환자에게 발생한 증상 정도를 확인하여 가급적 팍스로비드 복용을 끝까지 완료하도록 안내해 주시기 바랍니다.



**팍스로비드 처방 후,  
부작용이 있는 환자는 라게브리오를 처방해도 되나요?**

- A** 팍스로비드의 부작용이 있는 환자는 라게브리오의 투여 기준이 아닙니다. 환자의 상태를 확인하여 다른 대증치료약물을 처방하시면 됩니다.



**코로나19 치료제 복용 이력이 있는 환자가 재감염된 경우,  
치료제를 다시 처방해도 되나요?**

- A** 이전 코로나19 확진되어 치료제를 복용하였더라도 코로나19에 재감염되었다면 다시 치료제 복용할 수 있습니다.



**코로나19 치료제를 복용 중에 환자상태가 경증에서 중증이 되면 렘데시비르를 처방해도 되나요?**

**A** 치료제를 복용 중 환자가 증상 악화되어 렘데시비르 투여대상 적응증에 부합하게 되었을 경우, 중증 치료제인 렘데시비르 투여 가능하며, 복용 중이던 치료제는 끝까지 복용합니다.



**환자가 경구용 알약을 먹을 수 없는 상태일 때, 코로나19 치료제를 복용할 수 있나요?**

**A** 라게브리오 처방 가능 환자라면, 삼킴 곤란(경관 투약 환자군 등) 환자라도 의료인의 판단 하에 현탁액 형태로 조제(라게브리오 4캡슐 분말을 물 40ml에 희석) 및 투약 가능합니다.





2023. 4. 10.

KMA  
대한의사협회

질병관리청

# 코로나19 치료제 처방을 위해 꼭 확인하세요!

코로나19 치료제에 대한 보다 자세한 내용은  
질병관리청 코로나19 보건의료인용 누리집에서 확인하실 수 있습니다.

