


간막이를 없애고 소통·협력하는 유능한 정부를 만들겠습니다.



질병관리본부

수신 수신자 참조

(경유)

제목 중동호흡기증후군(MERS) 의심사례 발생시 신고 철저 및 의료인 감염 예방 주의 안내


1. '12년 9월부터 사우디아라비아를 중심으로 발생한 '중동호흡기증후군(MERS)'이 현재까지 16개 국가에서 총 495명의 감염환자가 확진(이중 145명 사망) 보고되고 있습니다(유럽CDC, 5.6).

2. MERS 발생 양상은 중동지역 2개 국가(사우디아라비아 411명, 아랍에미리트 49명 발생)에서 전체 발생건수의 93%를 차지하고 있으며, 이외 말레이시아, 필리핀, 그리스, 이집트, 미국 등 14개 국가에서 중동 발생지역에 거주하였거나 발생지역 여행을 통해 감염된 해외 유입 감염 사례로 발생하고 있으므로 이에 대한 지속적인 감염예방 주의가 요구되고 있습니다.

3. 이에 우리나라에서도 아라비아반도 지역을 다녀온 해외여행객 등을 통한 감염자의 우연입국의 사례가 발생할 수 있으므로 원인불명의 중증호흡기 질환으로 내원하는 환자 진료 시 의료인 감염을 막기 위한 개인보호구 착용 등의 호흡기 감염예방 수칙 준수를 통한 의료진 안전관리 철저 안내 및 중동호흡기증후군 의심사례가 발생할 경우 지체 없이 관할 보건소로 신고 될 수 있도록 협조 요청 드립니다.

<중동호흡기증후군(MERS) 등 신중호흡기감염병 환자 진료시 의료진 감염예방수칙>

- 환자 진료 전·후 손 씻기 또는 손소독을 시행합니다.
- 환자 진료 시 N95 이상의 호흡마스크, 고글 또는 안면부 가리개 및 1회용 가운을 착용하고, 체액이나 분비물이 발생할 가능성이 있는 경우 장갑을 착용합니다.
- 병실에서 발생한 폐기물은 병원 내 감염관리 원칙에 따라 처리합니다.
- 중동호흡기증후군 환자 입원 치료는 음압격리병상시설을 갖춘 의료기관에서 관리합니다.



<중동호흡기증후군(MERS) 의사환자 신고를 위한 주요 고려사항>

- 발열, 기침, 호흡곤란 등의 증상을 동반한 호흡기증상을 보이면서, 증상발생 14일 이내에 다음 중 해당되는 사항이 있는 경우
 - 사우디아라비아 등 중동호흡기증후군이 최근 유행한 지역을 여행한 적이 있음
 - 사우디아라비아 등 중동호흡기증후군이 최근 유행한 지역에서 거주하고 있음
 - 중동호흡기증후군 의심 또는 추정환자와 밀접한 접촉력*이 있음
 - * 밀접한 접촉력
 - 환자와 같이 거주한 사람
 - 환자를 돌본 간병인, 보건의료인
 - 환자의 체액, 호흡기 분비물에 직접적으로 접촉한 사람

끝.

질병관리본부장



수신자 대한의사협회, 대한병원협회, 대한감염학회, 대한응급의학회, 대한중환자의학회, 대한결핵및호흡기학회

전문연구원

오미나

보건연구사

손태종

공중보건위기 전결 2014. 5. 11.

대응과장 최혜련

협조자

시행 공중보건위기대응과-932 (2014. 5. 11.)

접수

우 363-700 충청북도 청원군 오송읍 오송생명2로 187

/ <http://>

전화번호 043-719-7249

팩스번호 043-719-7259

/ minaoh@korea.kr

/ 비공개(3)

위험할 땐 119, 힘겨울 땐 129