

[붙임 1] 치료중복 주의 의약품(64개) - 해열진통소염제(분류번호 114)1)

Group	성분
Group 1 비스테로이드성 소염 제(NSAID)	Aceclofenac
	Acemetacin
	Aspirin
	Alminoprofen
	Amfenac
	Celecoxib
	Cinnoxiam
	Clonixin
	Dexibuprofen
	Dexketoprofen
	Diclofenac
	Diflunisal
	Emorfazone
	Ethenzamide
	Etodolac
	Fenoprofen
	Fentiazac
	Flufenamic acid
	Flurbiprofen
	Glucametacin
	Ibuprofen
	Ibuproxam
	Imidazole salicylate
	Indometacin
	Ketoprofen
	Ketorolac
	Lonazolac
	Lornoxicam
	Loxoprofen
	Meclofenamate
Mefenamic acid	
Meloxicam	
Morniflumate	
Nabumetone	

1) 해당 성분의 효능 중, 분류번호 [114] 해열진통소염제에 해당되는 경우에만 한정

	Naproxen
	Nimesulide
	Oxaprozin
	Pelubiprofen
	Piroxicam
	Pranoprofen
	Proglumetacin
	Pyrazinobutazone
	Salsalate
	Sodium salicylate
	Sulindac
	Talniflumate
	Tenoxicam
	Tiaprofenic acid
	Tolfenamic acid
	Tolmetin
	Zaltoprofen
Group 2 아널리드계 해열진통제	Acetaminophen
	Propacetamol
Group 3 아편계 진통 제	Nalbuphine
	Tramadol
	Buprenorphine
	Butorphanol
	Pentazocine
Group 4 백각알칼로이드계 편 두통치료제	Dihydroergotamine
	Ergotamine/Caffeine
Group 5 선택적 5-HT₁ 수용체 효능제 (편두통치료제)	Almotriptan
	Naratriptan
	Sumatriptan
	Zolmitriptan

[붙임 2] 치료용량·치료기간 주의 의약품(1개)

연번	주성분 (제형)	성분 합량	1일 초회 또는 초기 용량 ¹⁾		1일 유지 또는 치료 용량 ²⁾		투여 기간 ³⁾			효능효과	용법용량
			최소	최대	최소	최대	최소	최대	최고		
1	Triazolam (정제)	0.125mg 0.25mg			0.125mg	0.25mg		10일	21일	불면증의 단기간 치료	단기간(보통 7-10일) 투여되어야 하며, 치료기간은 최대 2-3주를 초과하지 않는다. 환자에 따라 트리아졸람으로 서 0.125 ~ 0.25 mg을 취침 전에 경구투여한다.

- 1) 1일 초회 또는 초기 용량 : 최대는 허가사항 중 의약품의 1일 초회 또는 초기 약용량(상용량) 범위 중 최대용량을 나타내며, 최소는 최소용량을 말함
- 2) 1일 유지 또는 치료 용량 : 최대는 허가사항 중 의약품의 1일 유지 또는 치료 약용량(상용량) 범위 중 최대용량을 나타내며, 최소는 최소용량, 최고는 허가사항내 "1일 최대량 ~", "1일 ~을 초과하지 않는다", "1일 최고 ~ 까지 중량할 수 있다" 등의 표현에 근거하여 상용량의 범위에서 벗어나 환자의 연령, 증상 등에 따라 사용 가능한 1일 최고용량의 값을 말함
- 3) 투여 기간 : 허가사항 중 의약품의 효능효과, 용법·용량 등에서 정해진 최소, 최대, 최고 투여 기간